

**RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO**

01. Não usar Broncodilatadores de curta duração: 4h antes do exame, tais como: Combivent®, Duovent®, Bricanyl®, Atrovent®, Berotec® e Aerolim®.
02. Broncodilatadores de longa duração deve ser suspensos com 12h de antecedência, tais como: Fradil®, Foraseq®, Symbicort® e Fluir® e com 24h de antecedência Spiriva® e Alenia®.
03. Antialérgicos ou antigripais devem ser suspensos com 48h antes do exame;
04. Não usar corticoides inalatórios ou orais no dia do exame;
05. Poderá tomar outras medicações de uso contínuo como para Hipertensão e Diabetes;
06. Se estiver gripado remarque o exame após 15 dias;
07. Não há necessidade de jejum, mas evitar refeições volumosas 1h antes do exame;
08. Não ingerir café, achocolatados, chá de qualquer natureza;
09. Não praticar esforços físicos rigorosos no dia do exame;
10. Não fumar 4h antes do exame e não tomar bebida alcoólica;

**OBSERVAÇÕES:**

- Trazer o documento de identidade e cartão do convênio
- Trazer o pedido médico/guia.
- A suspensão de medicação deve seguir a orientação do médico caso não possa ser suspensa.

Data do teste: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Horário: \_\_\_\_:\_\_\_\_

**Confirme seu teste com 24h de antecedência.**

Nome: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_

Tel.: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Peso: \_\_\_\_\_ kg Altura: \_\_\_\_\_;

Fuma? ( ) Sim ( ) Não

Faz uso de alguma medicação? ( ) Sim ( ) Não

Se sim, qual(is)? \_\_\_\_\_

Guia do paciente presente: ( ) Sim ( ) Não. Convênio: \_\_\_\_\_